



CHECAR

Fatores que interferem na comunicação, na habilidade de responder e em outras alterações



OBSERVAR

Abertura dos olhos, o conteúdo da fala e os movimentos à direita e esquerda



ESTIMULAR

Som: pedidos solicitados por fala ou gritos
Físico: pressão na ponta dos dedos, trapézio ou entalhe supraorbital



AVALIAR

Realizar classificação de acordo com as respostas mais observadas

Melhor resposta ocular (O):

Critério	Observado	Classificação	Escore
Sem abertura ocular	1	1	1
Abertura ocular em resposta a dor	2	2	2
Abertura ocular ao chamado	3	3	3
Abertura ocular espontânea	4	4	4

Melhor resposta verbal (V):

Critério	Observado	Classificação	Escore
Sem resposta verbal	1	1	1
Sons incompreensíveis	2	2	2
Palavras inapropriadas	3	3	3
Confuso/Desorientado	4	4	4
Orientado	5	5	5

Melhor resposta motora (M):

Critério	Observado	Classificação	Escore
Sem resposta motora	1	1	1
Extensão em resposta à dor/descerebração	2	2	2
Flexão anormal em resposta à dor/decorticação	3	3	3
Reação inespecífica em resposta a dor	4	4	4
Localiza o estímulo doloroso	5	5	5
Obedece a comandos	6	6	6
Escala de Coma de Glasgow (O+V+M)			

Locais de estimulação física

Pressão das ponta do dedo Pinça de trapézio Entalhe supraorbital



Características das respostas de flexão

Modificado com permissão de Van Der Naalt 2004
Ned Tijdschr Geneeskd

