



COMPROVA

Factors que interfereixen en la comunicació, capacitat de respondre i altres lesions



OBSERVA

Obertura ocular, contingut del discurs i moviment tant del costat dret com de l'esquerra



ESTIMULA

So: dient o cridant una ordre
Física: pressió a la punta de dit, trapezi o arc supraorbital



VALORA

Puntua d'acord amb la millor resposta observada

Obertura ocular

Criteri	Observat	Classificació	Puntuació
Obre abans de l'estímul	✓	Espontània	4
Després de donar o cridar l'ordre	✓	Al so	3
Després de pressió a punta de dit	✓	A la pressió	2
No obre ulls, no hi ha cap factor que interfereixi	✓	Cap	1
Tancats per un factor local	✓	No valorable	NV

Resposta verbal

Criteri	Observat	Classificació	Puntuació
Dona correctament el nom, lloc i data	✓	Orientat	5
No està orientat però comunica de forma coherent	✓	Confús	4
Paraules aïllades intel·ligibles	✓	Paraules	3
Només sons o gemecs	✓	Sons	2
Sense resposta audible, no hi ha cap factor que interfereixi	✓	Cap	1
Factor que interfereix amb la comunicació	✓	No valorable	NV

Millor resposta motora


Criteri	Observat	Classificació	Puntuació
Obeeix ordre de 2 passos (p.ex: obri la boca i tregui la llengua)	✓	Obeeix ordres	6
Porta la mà per sobre la clavícula en estimular cap o coll	✓	Localitza	5
Doblega braç ràpidament, amb característiques normals	✓	Flexió normal	4
Doblega braç, amb característiques predominantment anormals	✓	Flexió anormal	3
Estén el braç pel colze	✓	Extensió	2
Sense moviment a braços o cames, no hi ha cap factor que interfereixi	✓	Cap	1
Paralitzat o amb altre factor limitant	✓	No valorable	NV

Llocs per a l'estimulació física

Pressió a punta de dit

Pinçament trapezi

Arc supraorbital



Característiques de la resposta de flexió

Modificat amb el permís de Van Der Naalt 2004
Ned Tijdschr Geneesk

Flexió anormal

Estereotip lent
Braç sobre tòrax
Rotació avantbraç
Polze apretat
Extensió cama



Flexió normal

Ràpida
Variable
Braç s'allunya del cos