



확인

의사소통을 방해하는 요인,
반응 능력과 기타 부상



관찰

눈 뜨기, 언어 반응, 운동 반응.



자극

소리 자극 : 음성 또는 외침
물리적 자극 : 손가락 끝,
등세모근, 눈확위패임 압박.



평가

관찰된 가장 높은 등급의 점수.

눈뜨기 (Eye opening)

기준	관찰	평가	점수
자극 전에 눈뜬	✓	지속적	4
음성 또는 외침 후에	✓	소리에 반응	3
손가락 끝 자극 후에	✓	자극에 반응	2
눈뜨지 않으며, 간섭요인 없음	✓	무반응	1
자극에 눈 감음	✓	측정 불가	NT

언어 반응 (Verbal response)

기준	관찰	평가	점수
사람, 장소, 날짜에 대한 정확한 인지	✓	지남력 있음	5
지남력 없으나, 일관성 있는 의사 소통 가능	✓	혼란스러움	4
이해할수 있는 단어 사용	✓	단어 사용	3
신음소리 / 끄끙거림	✓	소리	2
음성적 반응 없으며, 간섭요인 없음	✓	무반응	1
의사 소통을 방해하는 요인	✓	측정 불가	NT

운동 반응 (Best motor response)


기준	관찰	평가	점수
2가지 지시에 따름	✓	지시에 따름	6
자극에 반응해 손을 빗장뼈 위쪽으로 올림	✓	해당 부위에 한해서	5
자극에 팔꿈치를 빠르게 굽히지만 정상적임	✓	정상적인 굽힘	4
자극에 팔꿈치를 굽히고 분명하게 비정상적인 모습	✓	비정상적 굽힘	3
자극에 팔꿈치를 펴	✓	펴	2
팔/다리 움직임 없음, 간섭요인 없음	✓	무반응	1
마비나 기타 제한 요인	✓	측정 불가	NT

물리적 자극 위치

손가락 끝 압박

등세모근

눈확위패임



굽힘 반응의 특징

Van Der Naalt 2004의 허가를 받아 수정
Ned Tijdschr Geneeskd

비정상 굽힘

느리게
고정된 움직임
가슴쪽으로 돌아가는 팔
확진 손과 다리 펼침



정상 굽힘

빠르게
변하기 쉬움
몸에서 멀어짐