



## PĀRBAUDIET

Faktorus, kas apgrūtina komunikāciju, spējas atbildēt un citas traumas



## NOVĒROJIET

Acu atvēršanu, runas saturu un kustības ķermeņa labajā un kreisajā pusē



## STIMULĒJIET

Ar skaņu: uzruna vai uzsauciens  
Fiziski: spiediens uz pirkstgalu, trapeceveida muskuli vai supraorbitālo atveri



## VĒRTĒJIET

Piešķirot augstāko atbildes reakcijas novērtējumu

### Acu atvēršana

Kritērijs	Novērojums	Vērtējums	Balles
Atver bez stimulācijas	✓	Spontāna	4
Atver pēc uzrunas vai uzsauciena	✓	Uz skaņu	3
Atver pēc pirkstgala stimulācijas	✓	Uz spiedienu	2
Neatver, nav traucējoša faktora	✓	Nav	1
Aizvērtas lokāla faktora dēļ	✓	Nav pārbaudāma	NP

### Verbālā atbilde

Kritērijs	Novērojums	Vērtējums	Balles
Pareizi nosauc vārdu, vietu un datumu	✓	Orientēts	5
Nav orientēts, bet spēj komunicēt	✓	Apjucis	4
Atsevišķi saprotami vārdi	✓	Vārdi	3
Tikai vaidi / stenēšana	✓	Skaņas	2
Nav skaņas atbildes, nav traucējoša faktora	✓	Nav	1
Faktors, kas traucē komunikāciju	✓	Nav pārbaudāma	NP

### Labākā motorā atbilde


Kritērijs	Novērojums	Vērtējums	Balles
Izpilda divdaļīgu prasību	✓	Izpilda pavēles	6
Paceļ roku virs atslēgas kaula pēc galvas, kakla stimulācijas	✓	Lokalizē	5
Ātri saliec roku elkonī, nav patoloģisku iezīmju pārsvara	✓	Normāla fleksija	4
Saliec roku elkonī, ir patoloģisko iezīmju skaidrs pārsvars	✓	Patoloģiska fleksija	3
Veic ekstensiju elkonī	✓	Ekstensija	2
Nav kustību rokās / kājās, nav traucējoša faktora	✓	Nav	1
Paralizēts vai citi ierobežojoši faktori	✓	Nav pārbaudāma	NP

### Vietas fiziskai stimulācijai

Pirkstgala spiediens

Trapeceveida muskuļa  
saspiediens

Supraorbitālā atvere



### Fleksijas atbildes attēlojums

Modificēts ar atļauju no Van Der Naalt  
2004 Ned Tijdschr Geneeskd

#### Abnormal Flexion

Slow Stereotyped  
Arm across chest  
Forearm rotates  
Thumb clenched  
Leg extends



#### Normal flexion

Rapid  
Variable  
Arm away from body