



ตรวจ

หาปัจจัยแทรกแซงการสื่อสาร ความสามารถในการตอบสนอง และบาดแผลอื่นๆ



สังเกต

การลืมตา เนื้อหาของคำพูด และการเคลื่อนไหวของร่างกายซีกขวาและซ้าย



กระตุ้น

เสียง: สักด้วยการพูดหรือตะโกน
ร่างกาย: กดที่ปลายนิ้ว กล้ามเนื้อกราฟิเซียส หรือ รอยบากเหนือเบ้าตา



ประเมิน

ระบุผลประเมินตามระดับการตอบสนองสูงสุดที่สังเกตเห็น

การลืมตา

เกณฑ์	สังเกตเห็น	ผลประเมิน	คะแนน
ลืมตาค่อนใช้สิ่งกระตุ้น	✓	ลืมตาเอง	4
ลืมตาหลังได้รับคำสั่งให้ลืมตาด้วยการพูดหรือตะโกน	✓	ตอบสนองต่อเสียง	3
ลืมตาหลังกระตุ้นที่ปลายนิ้ว	✓	ตอบสนองต่อแรงกด	2
ไม่มีการลืมตาใดๆ ไม่มีปัจจัยอื่นแทรกแซง	✓	ไม่มีการตอบสนอง	1
ตาปิดเนื่องจากมีปัญหาระบบประสาท	✓	ไม่สามารถทดสอบได้	NT

การตอบสนองโดยคำพูด

เกณฑ์	สังเกตเห็น	ผลประเมิน	คะแนน
สามารถบอกชื่อตน สถานที่ และวันที่ได้อย่างถูกต้อง	✓	พูดรู้เรื่อง	5
สามารถสื่อสารได้แต่สับสน	✓	สับสน	4
พูดเป็นคำๆ ไม่มีความหมาย	✓	คำ	3
ส่งเสียงครวญครางไม่เป็นคำเท่านั้น	✓	ส่งเสียงไม่เป็นคำ	2
ไม่ส่งเสียงใดๆ ไม่มีปัจจัยอื่นแทรกแซง	✓	ไม่มีการตอบสนอง	1
มีปัจจัยอื่นแทรกแซงการสื่อสาร	✓	ไม่สามารถทดสอบได้	NT

การตอบสนองโดยการเคลื่อนไหวระดับสูงสุด


เกณฑ์	สังเกตเห็น	ผลประเมิน	คะแนน
สามารถทำตามคำสั่งสองต่อ	✓	สามารถทำตามคำสั่ง	6
ยกมือเหนือศีรษะไปขยับจุดกระตุ้นที่ศีรษะ คอ	✓	สามารถกำหนดจุดที่ถูกกระตุ้นได้	5
วอข้อศอกได้อย่างรวดเร็วแต่ลักษณะโดยรวมไม่ผิดปกติ	✓	วอข้อปกติ	4
วอข้อศอกได้แต่ลักษณะโดยรวมผิดปกติอย่างชัดเจน	✓	วอข้อผิดปกติ	3
ยึดแขนตรง	✓	ยึดข้อ	2
ไม่มีการเคลื่อนไหวขงแขน / ขา ไม่มีปัจจัยอื่นแทรกแซง	✓	ไม่มีการตอบสนอง	1
เป็นอัมพาตหรือมีปัจจัยอื่นจำกัด	✓	ไม่สามารถทดสอบได้	NT

ตำแหน่งสำหรับการกระตุ้นทรวงอก

กดที่ปลายนิ้ว

บีบกล้ามเนื้อกราฟิเซียส

รอยบากเหนือเบ้าตา



ลักษณะของการตอบสนองของการวอข้อ

ดัดแปลงมาจาก Van Der Naalt 2004 โดยได้รับอนุญาต
Ned Tijdschr Geneeskd

การวอข้อที่ผิดปกติ

ช้าแบบไม่ปกติ
แขนกับหน้าอก
แขนก่อนปลายแขนเข้า
นิ้วโป้งกำแน่น
ขยับออก



การวอข้อที่ปกติ

รวดเร็ว
เปลี่ยนได้หลายท่า
แขนอยู่ห่างจากกาย